

3.13**שיעור תמותת תינוקות, לפי סיבות נבחרות, דת וגיל****שיעורים ל-1,000 לידותחי**

												מספר ברשימה - תמותה - הדויה ICD-9 Number in mortality list - ICD-9	
1990-1994			1980-1984				(1)1970-1974				סיבות מות		
11-1 (2) months (2)	27-0 ימים days	סך הכל Total	11-1 (2) חודשים months	27-7 ימים days	6-0 ימים days	סך הכל Total	11-1 (2) חודשים months	27-7 ימים days	6-0 ימים days	סך הכל Total			
3.2	5.5	8.8	5.3	1.8	7.3	14.4	8.1	2.4	11.4	21.9	סך כולל		
0.0	..	0.0	0.1	0.0	-	0.1	1.5	0.1	0.0	1.6	מחלות זיהומיות של המעיים	1	
0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	0.1	0.1	0.6	כל המחלות/zיהומיות והטפיליות האחרות	2-10	
0.1	0.0	0.1	0.5	0.1	0.1	0.7	1.4	0.3	0.3	2.0	דלקת ריאות	34	
0.8	1.6	2.5	1.2	0.5	1.7	3.3	2.1	0.8	2.0	4.9	מוממים מולדים	45	
0.4	3.3	3.8	0.6	0.8	4.8	6.2	0.3	0.8	8.8	9.9	סיבות סב-ילדתיות	46-47	
0.2	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	0.3	0.3	0.1	0.0	0.4	סיבות חיצניות	50-55	
1.5	0.3	1.9	2.5	0.4	0.6	3.4	2.0	0.2	0.3	2.5	כל הסיבות האחרות והבלתי מוגדרות		
2.0	4.8	6.8	3.5	1.6	6.7	11.8	5.2	1.9	11.5	18.6	סך הכל יהודים(4) - סך הכל		
..	0.0	-	-	0.0	0.5	0.1	0.0	0.6	מחלות/Zיהומיות של המעיים	1	
0.1	(0.0)	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.4	כל המחלות/zיהומיות והטפיליות האחרות	2-10	
0.1	(0.0)	0.1	0.2	0.0	0.0	0.3	0.8	0.2	0.2	1.2	דלקת ריאות	34	
0.5	1.2	1.7	1.0	0.4	1.5	2.8	1.9	0.7	1.8	4.4	מוממים מולדים	45	
0.3	3.2	3.6	0.4	0.8	4.6	5.8	0.2	0.6	9.0	9.9	סיבות סב-ילדתיות	46-47	
0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.3	סיבות חיצניות	50-55	
0.9	0.3	1.2	1.6	0.3	0.5	2.4	1.4	0.2	0.2	1.8	כל הסיבות האחרות והבלתי מוגדרות		
6.3	7.2	13.5	10.9	2.7	9.0	22.6	17.0	3.7	11.4	32.1	בב' דמות אחורות(4) - סך הכל		
0.1	-	0.1	0.2	0.0	-	0.2	4.4	0.3	0.0	4.8	מחלות/Zיהומיות של המעיים	1	
0.3	(0.0)	0.3	0.6	0.2	0.1	0.9	0.7	0.2	0.1	1.0	כל המחלות/zיהומיות והטפיליות האחרות	2-10	
0.2	(0.0)	0.2	1.5	0.2	0.1	1.8	3.5	0.5	0.4	4.4	דלקת ריאות	34	
1.6	2.7	4.2	2.0	0.6	2.3	4.9	3.0	1.1	2.5	6.5	מוממים מולדים	45	
0.7	3.6	4.3	1.0	0.9	5.4	7.3	0.7	1.3	8.0	10.0	סיבות סב-ילדתיות	46-47	
0.4	0.2	0.5	0.5	0.1	0.0	0.6	0.5	0.1	0.1	0.7	סיבות חיצניות	50-55	
3.1	0.7	3.8	5.1	0.6	1.0	6.8	4.1	0.2	0.4	4.7	כל הסיבות האחרות והבלתי מוגדרות		

הנתונים מבוססים על: הodata פטירה, משרד הפנים.

.= חומר מקרים.

() = שיעורים, אחוזים, ממוצעים וכדומה המבוססים על 5 עד 19 מקרים.

.. = שיעורים, אחוזים, ממוצעים וכדומה המבוססים על פחות מ-5 מקרים.

1. לא כולל המקרים של תושבי מחוז ירושלים בשנים 1970-1973-1974.

2. 364-28 'מ'י'.

3. החל ב-2000 סווגו סיבות המוות לפי ICD-10.

4. החל בשנת 2000 - הנתונים מוצגים לפי קבוצות האוכלוסייה "יהודים ואחרים" ו"ערבים". השיעור ליהודים בשנים 2004-2000 הוא 3.8, השיעור ליהודים בשנים 2005-2009 הוא 2.9, השיעור ליהודים בשנים 2010-2014 הוא 2.5 ובסנים 2015-2018 השיעור ליהודים הוא 2.3. להרבה ראו: אתר הלמ"ס > בריאות > סיבות מות.

3.13

INFANT MORTALITY RATES, BY SELECTED CAUSES, RELIGION AND AGE

Rates per 1,000 live births

Cause of death	(3)2015-2018			(3)2010-2014			(3)2005-2009			(3)2000-2004		
	11-1 חודשים (2)	27-0 ימים (2)	סך הכל Total									
	1-11 months (2)	0-27 days		1-11 months (2)	0-27 days	Total	1-11 months (2)	0-27 days	Total	1-11 months (2)	0-27 days	Total
GRAND TOTAL	1.1	2.0	3.1	1.1	2.3	3.4	1.5	2.5	4.0	1.8	3.3	5.1
Intestinal infectious diseases	(0.0)	-	(0.0)	(0.0)	..	(0.0)	..	-	..	(0.0)	(0.0)	(0.0)
All other infectious and parasitic diseases	0.0	..	0.0	0.1	(0.0)	0.1	0.1	..	0.1	0.1	..	0.1
Pneumonia	(0.0)	-	(0.0)	(0.0)	..	(0.0)	(0.0)	..	(0.0)	(0.0)	-	(0.0)
Congenital anomalies	0.4	0.7	1.1	0.4	0.7	1.1	0.5	0.8	1.3	0.4	0.9	1.3
Causes of perinatal mortality	0.1	1.2	1.3	0.1	1.4	1.5	0.3	1.5	1.8	0.3	2.2	2.5
External causes	0.1	..	0.1	0.1	(0.0)	0.1	0.1	(0.0)	0.1	0.1	(0.0)	0.1
All other and unspecified causes	0.4	0.1	0.5	0.5	0.1	0.6	0.6	0.2	0.8	0.9	0.2	1.1
JEWS(4) - TOTAL	0.7	1.6	2.3	0.8	1.7	2.5	1.0	1.9	2.9	1.1	2.7	3.8
Intestinal infectious diseases	..	-	..	(0.0)	..	(0.0)	..	-	(0.0)
All other infectious and parasitic diseases	(0.0)	..	(0.0)	0.0	(0.0)	0.0	0.0	..	0.0	(0.0)	..	(0.0)
Pneumonia	(0.0)	-	(0.0)	(0.0)	..	(0.0)	(0.0)	..	(0.0)	(0.0)	-	(0.0)
Congenital anomalies	0.3	0.5	0.7	0.2	0.4	0.7	0.3	0.5	0.8	0.3	0.5	0.8
Causes of perinatal mortality	0.1	1.0	1.1	0.1	1.2	1.3	0.2	1.3	1.5	0.2	2.0	2.3
External causes	0.1	..	0.1	0.0	(0.0)	0.0	0.0	(0.0)	0.0	0.1	(0.0)	0.1
All other and unspecified causes	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1	0.4	0.4	0.1	0.5	0.4	0.1	0.6
OTHER RELIGIONS(4) - TOTAL	2.2	3.5	5.6	2.4	4.0	6.4	3.0	4.1	7.1	3.5	4.9	8.4
Intestinal infectious diseases	..	-	..	(0.0)	..	(0.0)	..	-	..	(0.1)	0.0	(0.1)
All other infectious and parasitic diseases	(0.1)	..	(0.1)	0.1	(0.0)	0.2	0.1	..	0.1	0.1	..	0.1
Pneumonia	..	-	(0.1)	..	(0.1)	(0.0)	..	(0.0)
Congenital anomalies	0.9	1.2	2.1	0.9	1.7	2.5	0.9	1.7	2.6	0.8	1.9	2.6
Causes of perinatal mortality	0.2	2.0	2.1	0.1	2.1	2.2	0.4	2.0	2.4	0.5	2.5	3.1
External causes	0.1	..	0.1	0.1	..	0.1	0.1	..	0.1	0.2	..	0.2
All other and unspecified causes	0.9	0.2	1.1	1.0	0.3	1.3	1.3	0.4	1.7	1.8	0.4	2.3

Data based on: Death Notification forms, Ministry of Interior.

- = no cases.

() = rates, percentages, averages, etc. based on 5-19 cases.

.. = rates, percentages, averages, etc. based on fewer than 5 cases.

1. Excl. cases of residents of East Jerusalem between 1970-1973.

2. 28-364 days.

3. Causes of death from 2000 were classified according to ICD-10.

4. As of 2000, data are presented according to population groups "Jews and others" and "Arabs". The rate for Jews in 2000-2004 was 3.8, the rate for Jews in 2005-2009 was 2.9, the rate for Jews in 2010-2014 was 2.5, and the rate for Jews in 2015-2018 was 2.3.

Also see: CBS website > Health > Causes of Death.

Published: 15.09.2020.